

بی حسی از ناحیه کمر(اسپاینال):

خوابیدن بهتر می شود و گاهی اوقات همراه با دو بینی می باشد . احتمال وقوع سردرد پس از عمل امروزه با توجه به وجود سوزن های بسیار باریک کاهش یافته است و معمولاً با تجویز مایعات خوراکی ، استراحت و مسکن های معمول کنترل می شود.

درمان سردرد

۱- همانطور که توضیح داده شد ، این سردرد در قسمت پیشانی و پشت سر احساس می شود که با نشستن شدت می یابد و با خوابیدن بهتر می شود . بنابراین سردردی که با تغییر وضعیت ادامه دار باشد سردرد ناشی از اسپاینال نیست.

۲- استراحت در بستر ، مصرف و تجویز مایعات خوراکی یا وریدی (سرم درمانی) روزانه سه لیتر یا بیشتر

- بیماران بسته به نوع داروی بی حسی تا سه ساعت بعد از عمل بی دردی دارند و پس از بازگشت درد نیاز به مسکن کمتری دارند.
برای مادرانی که تحت این بی حسی سزارین میشوند در صورت مناسب بودن شرایط نوزاد ، میتوانند از بدو تولد با نوزاد ارتباط پوستی و عاطفی برقرار کنند.



عوارض بی حسی اسپاینال:

سردرد : این درد در قسمت پیشانی و یا پشت سر احساس می شود که با نشستن شدت می یابد و با

بی حسی کمری باعث ایجاد بی دردی، بی حرکتی و شلی عضلانی می شود ولی باعث اختلال هوشیاری یا خواب نمی شود . این کار با استفاده از یک سوزن و تزریق داروی بی حسی از فضای بین مهره ای سوم و چهارم کمری(ممولا) صورت می گیرد . درد ناشی از این تزریق از درد ناشی از تزریق یک آمپول عضلانی کمتر است چرا که گیرنده های درد ناحیه پشت کمر از سایر نواحی بدن کمتر است . در هنگام تزریق دارو نیز دردی ایجاد نمی شود.

مزایای بی حسی اسپاینال:

- پیشگیری از عوارض فراوان بیهوشی
- هزینه اقدامات بیهوشی در این روش به مراتب کمتر خواهد بود.



**بیهوشی عمومی و بیحسی از ناحیه کمر و خود
مراقبتی در بیحسی کمری
کدشناسایی: ۰۹-wd-pf**



مشاور علمی: دکتر احمد یراقی متخصص بیهوشی

واحد آموزش سلامت همگانی و بیماران
مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی اصفهان

باز بینی زمستان ۱۳۹۹

۲- گیجی و منگی و حالت خاص پس از بیهوشی

۴- لزوم لوله گذاری در مسیر نای بیمار برای

رساندن اکسیژن و داروهای بیهوشی استنشاقی از

آن طریق و پذیرش عوارض احتمالی

۵- خطر آسپیره شدن محتویات معده در ریه ها در

بیماران با معده پر

۳- مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین مانند چای و قهوه

۴- مصرف شکلات تلخ

کمردرد:

احتمال بروز کمردرد در بی حسی اسپاینال و

بیهوشی عمومی وجود دارد ولی متاسفانه بیماران

وقوع آن را به سوزن زدن به کمر نسبت میدهند.

عوارض بیهوشی عمومی:



منبع : مراقبت های بیهوشی میلر ۲۰۱۸

راه ارتباطی با ما جهت راهنمایی و مشاوره :

-۰۳۱-۳۲۳۶۷۰۰۱-۲۳۵۴

۱- تهوع و استفراغ بعد از عمل با شیوع بالاتر

۲- درد بلافتاله بعد از عمل (گرچه در حد امکان با

مسکن ها کنترل می شود)