



توصیه هایی به بیماران قبل از انجام گرافی IVP



۱. عصر روز قبل از آزمایش از مسهل روغنی مانند روغن کرچک به میزان ۴۰ میلی گرم استفاده نمایید (به خاطر عاری شدن گاز و مواد دفعی از روده ها).
۲. روز قبل از انجام گرافی نهار سبکی میل نمایید (مثل سوپ ساده بدون سبزیجات و مواد نفخ زا)
۳. ساعت ۸ شب قبل از انجام گرافی شام سبکی میل نمایید مثل سوپ ساده بدون سبزیجات و مواد نفخ زا).
۴. صبح روز انجام گرافی از ساعت ۶ صبح، ۲ عدد قرص دایمتیگون هر ۲ ساعت استفاده نمایید (جویدنی).
۵. بیمارانی که عملکرد فیزیولوژیک طبیعی دارند به مدت چند ساعت قبل از انجام گرافی نباید از نوشیدن مایعات خودداری کنند.
- نکته: بیمارانی که نارسایی قلبی یا کلیوی دارند، دیابتی ها، کسانی که میزان اسیداوریک خونشان بالاست و اطفال و کسانی که میلوما مغز استخوان دارند به هیچ وجه نباید منع مصرف مایعات داشته باشند.
۶. کسانی که قرص متفورمین استفاده می کنند ۴۸ ساعت قبل و ۲۴ ساعت بعد از انجام گرافی از مصرف آن خودداری کنند.
- آزمایش Cr (کراتینین) و BUN، قبل از انجام گرافی برای بیماران باید انجام شود. (نکته: در صورتی که BUN: ۲/۵-۵) باشد و Cr: ۱/۴-۰/۷) باشد مجاز به دریافت ماده حاجب می باشید.
۷. در صورتی که بیمار هرگونه حساسیت غذایی یا دارویی دارد، اطلاع دهید تا آمپول هیدروکورتیزون و یا داروی ضد حساسیت برای بیمار تجویز شود.

راه های ارتباطی با ما:

www.beheshti.mui.ac.ir (سایت بیمارستان جهت دسترسی به منابع آموزشی و اطلاعات درخصوص خدمات ما)

۳۱-۰۳۳۶۷۰۰۱ شماره بیمارستان و شماره گیری داخلی ۲۵۰۱ واحد آموزش سلامت همگانی جهت دریافت مشاوره تلفنی همه روزه به جز



روزهای تعطیل